Documento de Consenso. Recomendaciones sobre la valoración de la proteinuria en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad renal crónica

38 min.

La enfermedad renal crónica (ERC) se caracteriza por una pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales. Su diagnóstico es importante tanto para la prevención del deterioro renal como para disminuir su elevada morbimortalidad. En este trabajo, elaborado con el consenso de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC) y la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), los autores pretenden proporcionar recomendaciones a los médicos y bioquímicos sobre las prácticas clínicas publicadas por distintas Sociedades Científicas.

R. Montañés Bermúdez (1),
S. Gràcia García (1),
D. Pérez Surrribas (2),
A. Martínez Castela (3)
J. Bover Sanjuán (3)

1 Comisión de Función Renal de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC)

2 Comisión de Proteínas de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC)

3 Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.)

doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Jan.10807
<http://www.revistanefrologia.com>
© 2011 Revista Nefrología. Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología
Nefrología 2011; 31(3): 331-45

Resumen

La presencia de concentraciones

elevadas de proteína o albúmina en orina, de modo persistente, es un signo de lesión renal y constituye, junto con la estimación del filtrado glomerular, la base sobre la que se sustenta el diagnóstico de la enfermedad renal crónica (ERC). Su presencia identifica a un grupo de pacientes con un riesgo superior de progresión de la enfermedad renal y con mayor morbilidad cardiovascular. El tratamiento con inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina o antagonistas del receptor de la angiotensina, en individuos con ERC y proteinuria, ha demostrado que disminuye tanto la progresión de la enfermedad renal como la incidencia de eventos cardiovasculares y muerte, por lo que la disminución del valor de la proteinuria es considerado un objetivo terapéutico. Pese a la importancia de la detección y monitorización de la proteinuria en el diagnóstico y seguimiento de la ERC, no existe consenso entre las guías de práctica clínica publicadas por distintas Sociedades científicas sobre cuáles son los valores que indican su presencia, si ésta debe ser definida en términos de albúmina o de proteína, el espécimen más adecuado para su medida o el tipo de unidades en que deben ser expresados los resultados. La finalidad de este documento, elaborado con el consenso de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC) y la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), es proporcionar recomendaciones, a los facultativos clínicos y de laboratorio, para la detección y monitorización de la proteinuria como marcador de la presencia de ERC en adultos y en niños. Las recomendaciones son el resultado de la búsqueda, evaluación y síntesis de la evidencia científica publicada sobre el tema en los últimos años.

Palabras clave: Enfermedad renal crónica. ERC. Proteinuria. Albuminuria. Cociente albúmina-creatinina en orina. Cociente proteína-creatinina en orina.
Correspondencia: J. Bover Sanjuán
Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.).
Fundació Puigvert.
Cartagena, 340-350. 08025 Barcelona.
jbover@fundacio-puigvert.es

Introducción

Distintos estudios epidemiológicos muestran que la enfermedad renal crónica (ERC) tiene una elevada prevalencia^{1,4}. El número de pacientes con ERC en estadios avanzados, que precisan de tratamiento renal sustitutivo, ha aumentado en los últimos años como consecuencia del envejecimiento de la población y del hecho de que, en la actualidad, se incluyen en diálisis individuos de más edad y con otros procesos asociados. Por otro lado, la incidencia y prevalencia de ERC debidas a glomerulonefritis o diabetes mellitus (DM) tipo 1 se han estabilizado siendo en la actualidad la arteriosclerosis, la DM tipo 2 o la hipertensión arterial (HTA) las principales causas de ERC; enfermedades que pueden afectar la función renal de modo silente, motivo por el cual la ERC es detectada en fases avanzadas de su evolución. El diagnóstico precoz es importante, tanto para la prevención del deterioro de la función renal como de las complicaciones cardiovasculares responsables de la elevada morbimortalidad que presentan estos pacientes, en relación con individuos de características clínicas semejantes pero sin ERC⁵.

Distintos estudios promovidos por la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) indican que la prevalencia de ERC se sitúa en

LABORATORY
INFORMATION
SYSTEM®

www.nextlab.com.ar

Tecnología Integrada

Flexibilidad y poder de parametrización. Software abierto que puede integrarse con instrumentos de cualquier fabricante. Solución ideal para instituciones públicas y privadas al contemplar facturación e integración con sistemas hospitalarios. NextLAB® LIS se presenta en tres versiones: Lite, Professional y Enterprise.

SOFTWARE INTELIGENTE

LITE

PRO

ENT

Nicolás de Vedia 1644 1er. Piso "1" C1429EIB
Nuñez, Buenos Aires, Argentina
T. [+5411] 60 91 30 94 Rot
F. [+5411] 60 91 21 00 Ext 3094

torno al 9,16% en la población mayor de 18 años⁶ y alcanza valores del 21% en los enfermos que acuden a las consultas de atención primaria⁷. Los datos procedentes de los registros de pacientes con ERC en estadio 5 y tratamiento renal sustitutivo (hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal) muestran una incidencia y una prevalencia de 129 y 1.039 casos por millón de habitantes/año, respectivamente⁸.

Los datos del Registro Español Pediátrico de Insuficiencia Renal (REPIR II), que incluye a los pacientes diagnosticados de ERC entre los estadios 2 y 5 en prediálisis, indican una incidencia y prevalencia de 8,6 y 71,0 casos por millón de habitantes/año, respectivamente, según datos del año 2008⁹. Las causas más frecuentes de ERC en la infancia son la uropatía obstructiva secundaria a alteraciones anatómicas de origen congénito, las glomerulonefritis y la HTA¹⁰.

La presencia de concentraciones elevadas de proteína o albúmina en orina, de modo persistente, es un signo de lesión renal y constituye, junto con la estimación del filtrado glomerular (FG), la base sobre la que se sustenta el diagnóstico de la ERC¹¹. Su presencia identifica a un grupo de pacientes con un riesgo superior de progresión de la enfermedad renal¹²⁻¹⁸ y con mayor morbilidad cardiovascular^{19,20}; además este riesgo es lineal y continuo, incluso para concentraciones dentro del intervalo de referencia²¹. El tratamiento con inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) o antagonistas del receptor de la angiotensina (ARA), en individuos con ERC y proteinuria, ha demostrado que disminuye tanto la progresión de la enfermedad renal como la incidencia de eventos cardiovasculares y de muertes, por lo que la disminución del valor de la proteinuria se considera un objetivo terapéutico²²⁻³⁰.

Pese a la importancia de la detección y monitorización de la proteinuria en el diagnóstico y seguimiento de la ERC, no existe consenso, entre las guías de práctica clínica publicadas, sobre cuáles son los valores que indican su presencia, si ésta debe ser definida en términos de albúmina o de proteína, el tipo de espécimen más adecuado para su medida o la utilidad de la tira reactiva como método inicial de cribado.

Objetivo y ámbito de aplicación

El objeto de este documento es proporcionar recomendaciones para la detección y monitorización de la proteinuria como marcador de la presencia de ERC en adultos y en niños. Las recomendaciones son distintas en cada grupo debido a las diferencias existentes, tanto en la prevalencia como en el tipo de enfermedad responsable de la ERC en cada uno de ellos.

Metodología utilizada en la realización del documento

Las recomendaciones que se presentan en este documento son el resultado de la búsqueda, evaluación y síntesis de la evidencia científica existente sobre la valoración de la proteinuria en el diagnóstico y seguimiento de la ERC. La información ha sido obtenida, fundamentalmente, a partir de las guías de práctica clínica publicadas en los últimos años.

En la elaboración de las recomendaciones no se han incluido ni el nivel de evidencia ni la fuerza de la recomendación asociada a cada una de ellas, debido a la incapacidad para poder intercambiar las distintas escalas utilizadas por las Sociedades científicas. Las guías consultadas, así como las escalas de evidencia utilizadas por las mismas, se describen al final del documento (anexo).

Criterios actuales de diagnóstico y clasificación de la enfermedad renal crónica

La National Sídney Foundation (NKF)-Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) en sus guías sobre evaluación, clasificación y estratificación de la ERC¹¹ define como criterios diagnósticos de ésta la existencia de:

1. FG inferior a 60 ml/min/1,73 m² durante un período de tiempo igual o superior a tres meses.
2. La presencia de lesión renal, con o sin descenso del FG, durante un período de tiempo igual o superior a tres meses. El concepto de lesión renal hace referencia a alteraciones estructurales o funcionales del riñón puestas de manifiesto directamente, a partir de alteraciones histológicas en la biopsia renal o indirectamente, por la presencia de albuminuria, proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o por técnicas de imagen.

La combinación de ambos criterios diagnósticos es la base para la clasificación de la ERC en 5 estadios (tabla 1). Debe destacarse que en los estadios 1 y 2 la presencia de lesión renal es diagnóstica por sí misma de ERC.

Esta definición y clasificación en estadios ha sido aceptada por la gran mayoría de Sociedades científicas, incluida la S.E.N.³¹ y la iniciativa internacional Kidney Disease: Improving Global Outcomes³². En los últimos años, se han propuesto modificaciones a esta clasificación como: a) añadir la letra «T», «D» o «p» para identificar a los pacientes con trasplante renal, en diálisis o con proteinuria, respectivamente³³⁻³⁵; b) la subdivisión del estadio 3 de ERC en 3A (FG 45-59 ml/min/1,73 m²) y 3B (30-44 ml/min/1,73 m²)^{32,34,36,37}; c) la eliminación de los estadios de ERC 1 y 2³⁸ o su unión en un úni-

MEG@NALIZAR

Tecnología y Calidad al servicio de la Salud

- El Megalaboratorio Institucional más completo de Cuyo
- Alta tecnología y bajos costos
- Participación constante en programas de control de calidad Externo

- Endocrinología
- Marcadores Tumorales
- Hematología
- Química Clínica
- Inmunoserología
- Virología
- Inmunología

Tabla 1. Clasificación en estadios de la enfermedad renal crónica según las guías K/DOQI de la National Kidney Foundation (2002)

Estadio	Descripción	Filtrado glomerular (ml/min/1,73 m ²)
1	Lesión renal con filtrado glomerular normal o aumentado	≥90
2	Lesión renal con disminución leve del filtrado glomerular	60-89
3	Distribución moderada del filtrado glomerular	30-59
4	Distribución severa del filtrado glomerular	15-29
5	Fallo renal crónico	<15

Tabla 2. Clasificación en estadios de la enfermedad renal crónica según las guías UK Renal Association (2007), NICE (2008) y SIGN (2008)

Estadio	Descripción	Filtrado glomerular (ml/min/1,73 m ²)
1	Filtrado glomerular normal o aumentado con evidencia de lesión renal	≥90
2	Distribución leve del filtrado glomerular con evidencia de lesión renal	60-89
3 A	Distribución moderada del filtrado glomerular con o sin evidencia de lesión renal	45-59
3 B		30-44
4	Distribución severa del filtrado glomerular con o sin evidencia de lesión renal	15-29
5	Fallo renal crónico	<15

Para todos los estadios incluir en la clasificación el sufijo "ov" en presencia de proteinuria.

Proteinuria definida como excreción de proteína >0,5 g/día o cociente concentración de proteína/creatinina en muestra de orina > 50 mg/mmol o concentración de albumina excretada en muestra de orina >0,3 mg/día (Guía NICE).

Tabla 3. Valores utilizados para la definición de proteinuria según distintas Sociedades Científicas

Espécimen	Adultos	Niños
Orina azo 24 horas	>100 mg/día ¹ >200 mg/día ²	>100 mg/día ³
Orina temporizada		>4 mg/diferencia ⁴
Orina aleatoria (10/10) ⁵	>200 mg/día ⁶ >40 mg/mmol ⁷ >50 mg/mmol ⁸ >100 mg/mmol ⁹	>6 meses a 2 años >50 mg/día ¹⁰ >50 mg/mmol ¹¹
	Tira reactiva <10+	<2 años >0,2 mg/mg ¹² >0,25 mg/mmol ¹³

¹ NICE, ² Cochrane, ³ WHO, ⁴ GIP, ⁵ GIP y ⁶ GIP en orina

⁷ Un valor <1+ se corresponde, en general, con una concentración de proteína de 50-100 mg/d

⁸ Guías K/DOQI, NICE, SIGN, CAP y UK Guidelines.

⁹ Guía CAPL.

¹⁰ Guía K/DOQI.

¹¹ Guía NICE.

¹² Guía SIGN.

¹³ Guía WHO.

¹⁴ Guía PARADE niños y Guía SIGN.

¹⁵ Guía PARADE niños.

co estadio³⁹, dada la inexistencia de una óptima medida de la función renal en este rango de FG; d) la necesidad de evidencia adicional de lesión renal para valores de FG superiores a 30 o 45 ml/min/1,73 m² como un prerrequisito para catalogar de ERC^{40,41}; e) el descenso del punto de corte de 60 a 45 ml/min/1,73 m² para el estadio de ERC³⁴²

o f) la introducción de valores de referencia de FG en función de la edad y el sexo^{11,39,40,42}. Algunas de estas consideraciones han sido incluidas en guías de publicación posterior a las KDOQI (tabla 2).

Definiciones

Proteinuria

En condiciones normales, un individuo sano elimina por la orina entre 40-80 mg de proteína/día, de los cuales aproximadamente 10-15 mg corresponden a albúmina y el resto está formado por la proteína de Tamm-Horsfall₄₃ y por pequeñas cantidades de proteínas de bajo peso molecular.

En este documento, el término proteinuria se utiliza para indicar la presencia de concentraciones de proteína en orina por encima del intervalo de referencia. Sin embargo, no existe un valor discriminante universal que la defina, ya que depende del espécimen utilizado para su medida (orina de 24 horas o aleatoria), la forma de expresión de los resultados (en términos de concentración o de excreción) o de la población en la que se valora (adultos o niños) (tabla 3).

Cuando el espécimen utilizado para su medida es una orina aleatoria, los resultados deben expresarse en forma de cociente entre la concentración de proteína y creatinina en orina (PR/CR).

Albuminuria

En los individuos sanos la excreción de albúmina en orina es inferior a 30 mg/día^{11,34,44,45}. En este documento el término albuminuria se refiere a la presencia de una excreción de albúmina superior a dicho valor. Cuando el espécimen empleado para su medida es una orina aleatoria, los resultados deben expresarse en forma de cociente entre la concentración de albúmina y creatinina en orina (ACR) y los valores discriminantes que muestran un mayor consenso internacional son >2,5 mg/mmol o >17 mg/g (hombres) y >3,5 mg/mmol o >25 mg/g (mujeres), aunque algunas Sociedades recomiendan el uso de un único criterio de decisión. Estos valores,

LABORATORIOS BACON S.A.I.C.

Diagnóstico

Screening Neonatal

TSH
Fenilalanina
Tripsina
Galactosa
17OHProgesterona
Biotinidasa

Ciencia e Investigación

Biología Molecular
Corticosterona en ratas
Fast Prep® - 24

Tarjetas Reglamentarias para Toma de muestra Neonatal

Autorizadas por ANMAT

Kits RIA - IRMA - ELISA

SafTEST

Kits Control de calidad:
- Biodiesel
- Alimentos

Asesoramiento General Servicio Técnico

Equipamiento e Insumos

Lectores verticales manuales y automáticos
Lavadores manuales y automáticos
Pipetas punto fijo y multicanal
Microtiras y microplacas alta densidad p/Elisa
Microplacas Filtrantes Millipore
Agitador orbital
Sacabocados para Screening Neonatal

que fueron obtenidos a partir de individuos con diabetes insulinodependiente^{46,47}, han sido extrapolados al resto de la población⁴⁸.

Los valores que definen microalbuminuria y macroalbuminuria son variables en función de la guía clínica consultada (tabla 4). Ambos términos, a pesar de ser ampliamente utilizados, pueden dar lugar a confusión por lo que deberían ser abandonados⁴⁹.

En condiciones normales la concentración de albúmina representa sólo una pequeña parte de la concentración de proteína presente en la orina. A medida que la concentración de proteína aumenta también lo hace la proporción de albúmina y oscila entre el 5 y el 70% para valores de PR/CR <2,5 y >90 mg/mmol, respectivamente^{50,51}. Debido a la relación variable entre ambas magnitudes, no es aconsejable el uso de factores de conversión a PR/CR a partir de ACR o viceversa¹¹.

Tipos de proteinuria

El aumento de la concentración de proteína en orina puede ser el resultado de distintos mecanismos etiopatogénicos⁵². Cada uno de ellos se asocia con una proteinuria de características cuantitativas y cualitativas diferentes.

La albúmina es la proteína en orina predominante en la ERC secundaria a DM, enfermedad glomerular o HTA, causas mayoritarias de ERC en el adulto. Su presen-

cia se debe a una alteración en el proceso de filtración, bien por daño estructural o bien por una alteración en las cargas eléctricas de la membrana basal del glomérulo.

La presencia en orina de proteínas de bajo peso molecular (2-microglobulina, 1-microglobulina, proteína enlazante del retino, etc.) denota la existencia de enfermedad túbulo-intersticial. Este tipo de proteinuria se debe a una alteración en el mecanismo de reabsorción en el túbulo renal que se produce como consecuencia de alteraciones funcionales o estructurales congénitas y que son el origen más frecuente de ERC en la infancia.

Otro tipo de proteinuria que debe destacarse es la ortostática o postural que aparece sólo cuando el individuo está en posición supina y desaparece en ortostatismo. Afecta sobre todo a niños y adolescentes, y tiende a desaparecer al llegar a la edad adulta. Su valor suele ser inferior a 1 g/m²/día y se debe a alteraciones hemodinámicas en el glomérulo renal^{53,54}.

Consideraciones metodológicas en la evaluación de la proteinuria

Condiciones preanalíticas

Pacientes

La presencia de fiebre, situaciones de estrés o la realización de ejercicio físico intenso⁵⁵ pueden producir elevaciones transitorias de la proteinuria que se resuelven pocos días después de la desaparición del factor cau-

sante. Asimismo, la presencia de infecciones del tracto urinario o la menstruación pueden ocasionar resultados falsamente positivos. Por ello, es recomendable evitar la recogida de orina para valoración de proteinuria en estas circunstancias. Valores utilizados para la definición de albuminuria según distintas Sociedades científicas

Tipo de espécimen

La eliminación variable de proteínas a lo largo del día, resultado de factores como el grado de hidratación, la actividad física o la ingesta proteica, ha determinado que clásicamente se haya considerado a la orina de 24 horas como el espécimen de referencia para medir la proteinuria. Sin embargo, los problemas asociados con la recogida de orina de 24 horas han llevado a buscar especímenes alternativos a la primera orina de la mañana u orinas aleatorias, expresándose los resultados en términos de concentración o bien, con el fin de eliminar las variaciones en función del grado de hidratación, referida a la concentración de creatinina en la orina. El conocimiento de la variabilidad biológica es un factor clave para dilucidar el tipo de espécimen más adecuado, tanto para el cribado como para el seguimiento de la proteinuria y valorar el significado clínico de un cambio.

Los estudios que han evaluado la idoneidad de PR/CR en orina de muestra aleatoria como alternativa a la excreción de proteína en orina de 24 horas⁵⁶⁻⁶⁰ coinciden en que existe una buena correlación y concordancia entre ambas magnitudes, incluso entre especímenes obtenidos en individuos con distinto grado de afectación de la función renal^{61,62} y para un amplio rango de valores de proteinuria^{63,64}, aunque tanto la correlación como la concordancia empeoran en caso de proteinuria de rango nefrótico (>3,5 g/1,73 m²/día)^{64,65}. Cuando PR/CR se expresa en mg/mg el valor cuantitativo obtenido es aproximadamente el mismo que se obtendría para una excreción de proteína expresada en g/día; si PR/CR se expresa en mg/mmol, la excreción en orina de 24 horas es aproximadamente 10 veces su valor asumiendo una excreción media de creatinina de 10 mmol/día³⁶.

De la misma forma, los estudios han evaluado el tipo de espécimen más adecuado para la medición de albúmina en orina (primera orina de la mañana u orina aleatoria como alternativa a la orina de 24 horas), así como el modo de expresión de

Tabla 4. Valores utilizados para la definición de albuminuria según distintas Sociedades científicas

Sociedad	Espécimen	Normal	Microalbuminuria*	Macroalbuminuria
SIGN	Orina aleatoria	<20 µg/min	20-200 µg/min	>200 µg/min
	Orina de 24 horas	<30 mg/día	30-300 mg/día	>300 mg/día
CARI	Orina aleatoria (µA/g)	H <2,5 mg/mmol M <3 mg/mmol	H 2,5-30 mg/mmol M 3-30 mg/mmol	>30 mg/mmol
	Tipo	<2 mg/dl	<3 mg/dl	>20 mg/dl
KDOQI	Orina de 24 horas	<30 mg/día	30-300 mg/día	>300 mg/día
	Orina aleatoria (µA/g)	H <17 mg/g <1,9 mg/mmol	H 17-250 mg/g >1,9 mg/mmol	H >250 mg/g >35 mg/mmol
KDOQI	Tipo	M <2,3 mg/g <2,8 mg/mmol	M >2,5 mg/g >2,8 mg/mmol	M >30,5 mg/g >40 mg/mmol
	Orina de 24 horas	<30 mg/día	30-300 mg/día	>300 mg/día
ADA	Orina aleatoria (µA/g)	H <17 mg/g M <2,5 mg/g	H 17-250 mg/g M 2,5-30 mg/g	H >250 mg/g M >30 mg/g
	Orina aleatoria (µA/g)	<10 mg/g	10-100 mg/g	>100 mg/g
SEN-somPYC	Orina aleatoria (µA/g)	<30 mg/g	30-299 mg/g	>300 mg/g

ACR: cociente albuminacreatinina en orina; H: hombres; M: mujeres.
 Para convertir de Sistema Internacional de Unidades (µg/min) a unidades convencionales (mg/d), multiplicar por 60.
 Para convertir de unidades convencionales (mg/g) a Sistema Internacional de Unidades (µg/mmol), multiplicar por 10⁻³.
 *Nota: aunque en el documento no se aconseja el empleo de estos términos, se han incluido en la tabla ya que es así como aparecen en las guías consultadas.

HACIA UN LABORATORIO MÁS EFICIENTE JUNTO A LAS SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE NOEMALIFE

LEADING HEALTHCARE IT SOLUTIONS

NoemaLife ofrece **soluciones informáticas** confiables, eficaces e innovadoras, para las más prestigiosas Organizaciones de Salud, con el objetivo de mejorar y facilitar los procesos clínicos y asistenciales en todos los niveles de la Organización. La completa suite de soluciones de vanguardia garantiza una **reducción de costos** y un **verdadero aumento de calidad**. En el sector Diagnóstico, la **experiencia** de más de **1.200 Laboratorios de Análisis** de todo el mundo informatizados por un **LIS NoemaLife** -Laboratory Information System-, confirma la excelencia innovadora de un aliado en **crecimiento continuo**.

NOEMALIFE
WE CARE

**HEALTH
CARE**
IT SOLUTIONS

NOEMALIFE ARGENTINA
Viamonte 811 2° Piso
Buenos Aires, ARGENTINA
+5411 4328 4611
argentina@noemalife.com
www.noemalife.com

los resultados (concentración de albúmina en orina frente a ACR) han demostrado una mayor concordancia de la primera orina de la mañana frente a la segunda o a una orina aleatoria^{66,67} y una menor variabilidad intraindividual para este tipo de espécimen, expresado como ACR. En consecuencia, se considera que la primera orina de la mañana es el espécimen más adecuado tanto para el cribado de albuminuria como para su monitorización, expresándose los resultados como ACR (mg/mmol, mg/g) frente a la medida de la concentración (mg/l).

Conservación

La muestra de orina es estable durante 7 días a 2-8 °C^{49,68}. Si se precisa congelar, la temperatura debe ser ≤ 70 °C, ya que valores superiores, en especial a -20 °C, producen un descenso en la concentración de albúmina que afecta, sobre todo, a orinas con valores de albúmina inferior a 300 mg/l⁶⁹⁻⁷². La descongelación se debe realizar a temperatura ambiente y la muestra se debe homogeneizar antes de la medición con la finalidad de disolver los precipitados que hayan podido formarse, así como la albúmina adsorbida por el contenedor. El efecto de la congelación y de la descongelación sobre las distintas formas moleculares no es bien conocido.

Previamente a la congelación y al análisis se debe inspeccionar visualmente la orina para detectar la presencia de precipitados, que deben ser eliminados por centrifugación.

Si por algún motivo es necesario realizar una recolección de orina de 24 h la orina debe mantenerse refrigerada, y no es necesario añadir ningún conservante.

Métodos para la valoración de proteinuria

Métodos de cribado

Tira reactiva para el cribado de proteína

La tira reactiva está formada por una superficie de celulosa impregnada con azul de bromotetrafenol tamponado a pH 3,068 que, al unirse a las proteínas de la muestra, produce un cambio de color en la tira de intensidad variable en función de su concentración. El resultado se interpreta mediante la comparación visual del color obtenido respecto a una escala cromática y se traduce en valores que oscilan desde negativo hasta una escala de «+» correspondiente a distintos valores de concentración que es variable en función del

fabricante de la tira. El uso de equipos de lectura automatizada reduce la posibilidad de error y la variabilidad de interpretación de resultados interpersonal⁷³. Se considera que existe proteinuria cuando hay un cambio de color de «1+» o superior, que para la mayoría de los fabricantes corresponde a una concentración entre 150 y 300 mg/l⁶⁸. Las tiras reactivas son especialmente sensibles a proteínas de carga negativa, como la albúmina, y menos a globulinas y proteínas de bajo peso molecular. Entre las limitaciones de estos sistemas de medida destacan: la incapacidad para detectar concentraciones inferiores a 300 mg/l, la producción de falsos resultados negativos en orinas diluidas y falsos positivos en orinas concentradas, alcalinizadas, con presencia de hematuria y de componentes coloreados como bilirrubina y fármacos (ciprofloxacino, quinina y cloroquina)⁷⁴.

Distintos estudios han comparado la exactitud diagnóstica de la tira reactiva frente a la medida de proteína en orina de 24 horas en poblaciones con alta prevalencia de proteinuria⁷⁵⁻⁷⁷. Los resultados muestran una sensibilidad y especificidad variable en función de la concentración de proteína utilizada como punto de corte. Por ello, la mayoría de guías de práctica clínica desaconsejan su uso como prueba de cribado para detectar la presencia de proteinuria^{34,35,45} y las que la incluyen aconsejan la confirmación de un resultado positivo mediante una medida cuantitativa^{11,78}.

En los últimos años, algunos fabricantes han incorporado a sus tiras reactivas una zona que permite medir la creatinina y expresar de modo semicuantitativo el cociente proteína/creatinina, con lectura del resultado visual o automatizado. Aunque los resultados iniciales han mostrado su eficacia en la monitorización de pacientes con ERC⁷⁹ son necesarios más estudios que evalúen su utilidad diagnóstica.

Tira reactiva para el cribado de albúmina

La medida semicuantitativa de albúmina a partir de tiras reactivas se basa en métodos inmunológicos o no inmunológicos, que usan una superficie de celulosa impregnada con un derivado de la tetrabromosulfotaleína⁶⁸, y que son capaces de detectar pequeñas concentraciones de albúmina (30-40 mg/l). Existen también en el mercado dispositivos que incorporan en la tira dos zonas de reacción, una para la albúmina

impregnada con un colorante de elevada afinidad y especificidad (tetrabromosulfotaleína) y otra zona para la medida de la creatinina (basada en la actividad peroxidasa frente a un complejo cobre-creatinina), que proporcionan medidas semicuantitativas del cociente albúmina/creatinina en tres categorías, <3,4, 3,4-33,9 y >33,9 mg/mmol. Estos sistemas han sido recientemente evaluados con resultados que indican buena exactitud diagnóstica, tanto en población general como en pacientes con ERC de distinta etiología^{80,81}.

Los estudios realizados para conocer la exactitud diagnóstica de la tira específica para la detección de albúmina a concentraciones superiores a 30 mg/g creatinina muestran una baja sensibilidad (del 37 al 83%) y una elevada especificidad (del 93 al 98%). El valor predictivo positivo y negativo es variable dependiendo de la concentración utilizada para definir albuminuria³⁴.

Métodos cuantitativos

Métodos cuantitativos para la medida de proteína

La cuantificación de proteína en orina presenta importantes dificultades debido a la variabilidad en la composición y proporción de los distintos tipos de proteínas, así como de las elevadas concentraciones de sustancias no proteicas que pueden interferir en los procedimientos de medida. Los métodos más utilizados son los turbidimétricos (basados en la unión de las proteínas a sustancias del tipo ácido tricloroacético o cloruro de bencetonio) y los de fijación a colorantes (Ponceau-S, azul brillante de Coomassie y rojo de pirogalol molibdato). Tanto unos como otros presentan diferente sensibilidad y especificidad analítica para los distintos tipos de proteínas, reaccionando en mayor proporción con la albúmina⁸²⁻⁸⁴.

No existe actualmente ningún procedimiento de medida ni material de referencia para la determinación de proteína en orina, lo que da lugar a una gran variabilidad entre los resultados obtenidos en diferentes laboratorios. Esta variación afecta, sobre todo, a las concentraciones bajas y disminuye para las más elevadas en parte debido a la mayor concentración relativa de albúmina que presentan estas últimas.

Los datos procedentes del Progra-

ma de Control Externo de la Calidad (FPCQLC) de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC) del año 2009 indican que los métodos más empleados para la medida de proteína son los turbidimétricos que utilizan cloruro de bencetonio (48,5% de los laboratorios) y los de fijación al colorante rojo de pirogalol (44,9% de los laboratorios). Los coeficientes de variación oscilaron entre 7,7 y 10,5% (turbidimétricos) y 4,5 y 7,7% (fijación al colorante rojo de pirogalol) para un intervalo de concentraciones entre 0,31 y 1,07 g/l₈₅.

Métodos cuantitativos para la medida de albúmina

Los métodos más habituales para medir la albúmina en orina son los inmunoanálisis turbidimétricos o nefelométricos con límites de detección entre 2 y 10 mg/l. Los anticuerpos empleados pueden ser monoclonales o policlonales con distinta sensibilidad para la detección de formas anómalas o de fragmentos de albúmina presentes en la orina. En los últimos años, han aparecido métodos basados en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) que producen valores más altos con respecto a los inmunoanálisis ya que detectan formas de albúmina no inmunoactivas.

Distintos programas de control externo de la calidad evidencian que existen diferencias entre los resultados obtenidos por distintos laboratorios y en las unidades de expresión de los mismos₈₆. Ello es consecuencia de la inexistencia de un procedimiento analítico de referencia; de un material de referencia internacional; de

la presencia en orina de diferentes formas moleculares de la albúmina, tanto en el espécimen como en los calibradores (moléculas fragmentadas, glicosiladas y formas dimericas); de albúmina degradada o no reactiva a los anticuerpos; de las uniones inespecíficas de la albúmina a los tubos utilizados para la recolección del espécimen, así como de los fenómenos de polimerización y fragmentación que se producen durante su almacenamiento y en los procesos de congelación y descongelación de las muestras₈₇.

La mayoría de fabricantes de productos para el diagnóstico in vitro declaran que el valor asignado a sus calibradores es trazable al material de referencia certificado ERM[®]DA470k/IFCC (antes denominado CRM 470) distribuido por el Instituto para Materiales de Referencia y Medida de la Comisión Europea. Este material, con una concentración de albúmina de 37,2 g/l, es el mismo que se emplea para la calibración de la albúmina en suero. Existen diferencias entre los fabricantes en cuanto a los protocolos de preparación del calibrador, diluyente utilizado, factor de dilución, matriz de suero u orina, etc. Recientemente, la Sociedad Japonesa de Química Clínica, ha desarrollado un candidato a material de referencia, elaborado a partir de albúmina humana monomérica con una pureza superior al 97,5% por HPLC, en una matriz acuosa tamponada y liofilizada y que está en fase de asignación de valor por el Comité Japonés de Estándares del Laboratorio Clínico₈₈. Asimismo, investigadores de la Clínica Mayo están trabajando en un método basado en cromatografía líquida

acoplada a espectrometría de masas por dilución isotópica (LC-IDMS)₈₉ como posible candidato a método de referencia.

La consecuencia del uso de inmunoanálisis específicos para la determinación de la albúmina es la superioridad en términos analíticos de la medida de albúmina frente a la de proteína. Los datos procedentes del FPCQLC de la SEQC del año 2009 muestran que el 87,8% de los laboratorios inscritos determinan la albúmina en orina mediante métodos turbidimétricos, frente al 12,1% que utilizan métodos nefelométricos. Los coeficientes de variación oscilaron entre 5,4 y 10,0% (turbidimétricos) y 6,8 y 15,5% (nefelométricos) para un intervalo de concentraciones entre 260 y 970 mg/l₈₅.

Futuras líneas de investigación

En el año 2007 tuvo lugar una conferencia organizada por el Laboratory Working Group de la National Kidney Disease Education Program (NKDEP) y la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), cuyos objetivos fueron poner de manifiesto los problemas asociados a la medición de la albuminuria y organizar grupos de trabajo con la finalidad de realizar recomendaciones que pudiesen ser incluidas en las guías de práctica clínica₄₉. Los aspectos que el grupo de expertos consideró que precisaban investigación con el objetivo de la estandarización de la medida de la albúmina y expresión de resultados fueron los siguientes:

1. Los requerimientos preanalíticos en relación con el tipo de contenedor utilizado

DXS Diagnostic Innovations

tecnolab
S.a.

DXS es ahora parte de Qiagen Diagnóstica y ofrece:

- Kits para Análisis de Tumores
- Detección de mutaciones en:
 - K-ras
 - EGFR
 - PI3K Oncogenes

Todos los kits son Real-Time PCR, basados en tecnologías **Scorpions y ARMS** (alelo específicos PCR).

en la recolección del espécimen; la necesidad de profundizar en el conocimiento sobre variabilidad biológica para la selección del momento de obtención del espécimen o la influencia de la sangre, fluido seminal y otros contaminantes fisiológicos presentes en la orina.

2. Precisar la definición del mesurando e investigación de las formas moleculares de albúmina en orinas recién emitidas y del grado de degradación de la albúmina en función de las condiciones de almacenamiento.

3. Desarrollar un procedimiento de medida de referencia, así como materiales de referencia primarios y secundarios para la albúmina y la creatinina en orina de comutabilidad validada y acreditada por el Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine (JCTLM).

4. Determinar el procedimiento de medida más adecuado debido a la variable composición de la orina.

5. Definir los requerimientos clínicos para el error total admisible de los procedimientos de medida, así como los materiales apropiados para utilizar en Programas de Control de Calidad, que permitan la comparación entre los distintos métodos.

6. Valorar si son necesarios diferentes límites de decisión en función del espécimen, características antropométricas (edad, sexo o etnia) y distintos grupos de población (población general o de alto riesgo como DM, HTA o ECV).

7. Investigar la utilidad de ecuaciones específicas por edad y sexo que permitan convertir ACR en valores de excreción de albúmina/día para los que un solo límite de referencia puede ser apropiado.

Aspectos clave sobre la valoración de la Proteinuria en las guías de práctica clínica

Distintas Sociedades científicas han elaborado guías que incluyen recomendaciones para la evaluación de la proteinuria en el contexto de la ERC. Los aspectos más importantes se resumen en la tabla 5 ordenados según el año de publicación y se exponen a continuación.

Población diana

Todas las guías coinciden en que el cribado de proteinuria debe realizarse en individuos con elevado riesgo de ERC: DM, HTA, ECV,

FG inferior a 60 ml/min/1,73 m², enfermedades multisistémicas con posible afectación renal, edad superior a 60 años, antecedentes familiares de ERC o etnias específicas con elevada prevalencia de ERC. Existen guías con recomendaciones para grupos específicos de población como las de la American Diabetes Association (ADA)₉₀ o las del Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure⁹¹.

Uso de la tira reactiva para la identificación de la proteinuria

Sólo las guías KDOQI₁₁ y Welsh Renal NSF₇₈ consideran el uso de la tira reactiva aceptable para el cribado de la proteinuria, proponiendo que cualquier resultado «>1+» sea confirmado mediante una medida cuantitativa (PR/CR o ACR) dentro de los 3 meses siguientes. El resto de guías desaconsejan su uso debido a su baja sensibilidad y especificidad, a pesar de que existe evidencia que un valor de tira «>1+» puede ser usado para identificar a pacientes con alto riesgo de ERC terminal y ECV35.

Espécimen

Todas las guías convienen en afirmar que el espécimen más adecuado es la orina de 24 horas aunque los problemas asociados a su correcta recogida dificultan su utilización en la práctica clínica. Por ello, aconsejan el uso de la muestra de orina, preferiblemente la obtenida de la primera micción de la mañana, aunque una orina aleatoria también es aceptable.

Magnitud biológica que debe determinarse (proteína frente a albúmina)

Existe un consenso general entre las guías en que la determinación de PR/CR o ACR, en una muestra de orina aleatoria, debe reemplazar a la medida de la proteína o albúmina en orina de 24 horas. Asimismo, todas las guías coinciden en que el análisis de proteína en orina carece de suficiente sensibilidad para identificar la presencia de nefropatía diabética incipiente y aconsejan la determinación de albúmina, expresada como ACR y con periodicidad anual. En otras circunstancias, la recomendación de usar ACR o PR/CR es variable. Así, KDOQI, KDIGO, ADA, NICE, JNC-7 y SEN-semFYC aconsejan preferentemente el uso de ACR y, en cambio, PARADE (niños), CARI, SIGN, UK Guidelines, Welsh Renal NSF y CSN recomiendan PR/CR.

Valores de corte

Los intervalos de referencia, así como los

valores considerados patológicos por cada una de las guías, se indican en la tabla 5.

Unidades de expresión de resultados

Las guías PARADE (niños), KDOQI, JNC-7, CARI, KDIGO, ADA y SEN-semFYC recomiendan el uso de unidades convencionales (mg/g), el resto aconsejan el uso de Sistema Internacional de Unidades (mg/mmol).

Recomendaciones para niños

Sólo las guías KDOQI, Welsh Renal NSF, PARADE niños y CARI incorporan recomendaciones específicas para niños. Todas ellas coinciden en que para la detección y monitorización de proteinuria en niños se debe usar PR/CR, excepto en niños con DM, de inicio pospuberal y más de 5 años de evolución, en los que se aconseja la utilización de ACR, de la misma forma que en los adultos.

Esta recomendación es consecuencia de la escasa prevalencia de ERC debida a DM o HTA en la infancia con respecto a enfermedades derivadas de anomalías en el tracto urinario o alteraciones tubulares congénitas, que se caracterizan por la eliminación de proteínas de bajo peso molecular.

Recomendaciones

Evaluación de la proteinuria y/o albuminuria

1. La presencia de concentraciones elevadas de proteína o albúmina en orina, en dos o más ocasiones durante un período igual o superior a tres meses, es un signo de lesión renal y constituye, junto con la estimación del FG, la base sobre la que se sustenta el diagnóstico de ERC.

2. En los individuos con riesgo de desarrollar ERC la estimación del filtrado glomerular debería acompañarse de la medida de la concentración de proteína y/o albúmina en orina.

3. La detección y monitorización de proteína y/o albúmina en orina debe estar basada en una medida cuantitativa.

4. En la detección, clasificación en estadios y monitorización de la ERC, la presencia de proteinuria debe ser valorada:

a. En individuos adultos mediante la determinación del cociente albúmina/creatinina en muestra de orina. La albuminuria es un marcador más sensible que la proteinuria en el contexto de ERC debida a DM, HTA o enfermedad glomerular, todas ellas etiologías responsables de la mayoría de ERC en el adulto. Si un laboratorio decidiera

Laboratorio
para Laboratorios

Acumulamos una amplia
trayectoria

Nos destaca nuestra
calidad analítica

Contamos con
tecnología de punta

Ponemos a su servicio un
equipo de destacados profesionales
para atender todas sus consultas

- > Endocrinología
- > Biología Molecular
- > ADN - Filiación
- > Inmunología
- > Autoinmunidad
- > Toxicología
- > Pesquisa Neonatal
- > Cromatografía
- > Virología

Comuníquese al:

(011) 5199-4800
Int. 4817

y empiece a confiar en nosotros

Tabla 5. Resumen de las guías (Continuación)

Guía	Detección	Monitorización	Especimen Tipo de muestra Cantidad Medios	Unidades	Variancia de referencia	Criterios de calidad
ACB Renal Sección 1007	El resultado de un método puede usarse para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica		P S	mg/dL mg/dL	No consta	Criterios de calidad de los métodos con ICA y ARA No UV PACB 0,200 mg/dL E-DM ACR HbA2c mg/dL ACR M-HbA2c mg/dL
Wash Renal ISBP 2007	ACR y ACR4+DM Método: Algoritmo para ERO, validado con tira reactiva, no validado con tira reactiva con tira reactiva PACB	ACR y ACR4+DM	Proteína principal Creatinina secundaria	No consta Se debe hacer estandarización de unidades para evitar confusiones	No consta	Criterios de calidad de los métodos con ICA y ARA No UV PACB 0,200 mg/dL E-DM ACR HbA2c mg/dL ACR M-HbA2c mg/dL
SGM 2008	No utilizar un resultado de forma rápida para evaluar la presencia o ausencia de diabetes En sujetos con alta probabilidad de tener diabetes PACB ACR y DM	En pacientes con ERO conocido no diabético, usar PACB para evaluar el riesgo de progresión a una ERO	No consta	PACB mg/dL ACR mg/dL	PACB 0,10 mg/dL ACR HbA2c mg/dL M-HbA2c mg/dL	PACB 0,200 mg/dL ACR HbA2c mg/dL
ISBP 2008	Los resultados de la prueba de forma rápida se utilizan a base de controles y de casos clínicos validados ACR Si ACR es mayor que 300 mg/dL deben confirmarse los resultados de forma rápida Si el resultado de ACR es menor que 300 mg/dL, la confirmación no es necesaria	ACR Puede usarse para diagnóstico de ACR en DM de pacientes diabéticos	P A	mg/dL mg/dL ACR mg/dL	No consta	Criterios de calidad de los métodos con ICA y ARA No UV PACB 0,200 mg/dL ACR HbA2c mg/dL ACR M-HbA2c mg/dL Criterios de calidad de los métodos con ICA y ARA No UV PACB 0,200 mg/dL ACR HbA2c mg/dL ACR M-HbA2c mg/dL

sustituirse por el de albuminuria.

Composición de las Comisiones de la SEQC
Función renal: J. Ballarín Castán*, P.
Bermejo López-Muñoz, J. Bover Sanjuán*, A.
Cases Amenós*, M.J. Díez de los Ríos
Carrasco, S. Gràcia García, J.A. Jiménez
García, C. Macías Blanco, R. Martínez López,
R. Montañés Bermúdez (Presidenta), G.
Ruiz Martín, L.J. Morales García, J. Ruiz
Altarejos, S. Sanz Hernández, S. Ventura
Pedret.

*Miembros asociados.

Proteínas: C. Bermudo Guitarte, M.C.
Cárdenas Fernández, M. Cortés Rius, M.
Fernández García, M. García Montes*, C.
Martínez-Brú (Presidenta), D. Pérez
Surribas, T. Rodríguez González, C.
Valdecabres Ortiz, J.A. Viedma Contreras, E.
Zapico Muñiz.

Miembros de la S.E.N. que han colaborado
en la revisión del documento: R. Alcázar
Arroyo, J.L. Górriz Teruel, F. Rivera
Hernández.

**MININEPH™
PLUS**

**Binding
Site**

NEFELOMETRÍA PORTÁTIL

IgG
IgA
IgM
C3
C4
Subclases de IgG
ASO
RF
CRP

Apolipoproteína A1
Apolipoproteína B
2 Microglobulina
Ceruloplasmina
Haptoglobina
Microalbúmina
Prealbúmina
Transferrina
-1- Antitripsina

Freelite™

Cadenas Livianas
Libres! en suero

V. TOKATLIAN S.A.

Tte. Gral. J.D. Perón 4047/49 - C1198AAY Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 11 4862-5665 - Fax: 0800 333-4605 / +54 11 4865-7952
ventas@vtokatliansa.com / info@vtokatliansa.com

CB 350i La evolución natural

La evolución en análisis clínicos requiere de nuevos instrumentos con capacidades para poder integrarse fácilmente al software de gestión analítica. La bidireccionalidad, el código de barras para muestras, los puertos USB de alta velocidad, los reactivos en envases dedicados codificados y entornos operativos intuitivos ya son condiciones indispensables en aquellos laboratorios, que por su tamaño, necesitan integración rápida de todos los datos en un host central.

CB350i de Wiener lab. cumplimenta los requisitos anteriores, y a ellos suma velocidad, exactitud y precisión. Además, la integración de reactivos e instrumento en un sistema facilita la validación de cualquier normativa de calidad que adopte el laboratorio.

Con capacidad para determinar hasta 80 parámetros simultáneamente (330 test/hora), y con un módulo ISE (204 test/hora) puede poner otra vez, el futuro a su alcance.

Consulte por más detalles técnicos y por nuestros planes de venta y comodato.
Va a sorprenderse!!!

ISO 9001:2000

Asistencia Técnica WL

www.wiener-lab.com.ar
marketing@wiener-lab.com.ar

Producido en Argentina

Wiener Laboratorios SAIC

Riobamba 2944,
S2003GSD Rosario,
Argentina
Tel.: +54 341 4329191/6

Moreno 1850, 2° piso,
C1094ABB Buenos Aires,
Argentina
Tel.: +54 11 43754151/4

Wiener lab
G R O U P

www.wiener-lab.com.ar

- risk, assessment, detection, elimination (PARADE): a position paper of the National Kidney Foundation. *Am J Kidney Dis* 1999; 33: 1004-10.
- 20.Brantsma AH, Bakker SJ, De ZD, De Jong PE, Gansevoort RT. Extended prognostic value of urinary albumin excretion for cardiovascular events. *J Am Soc Nephrol* 2008; 19: 1785-91.
- 21.Bover J, Fernández-Llama P, Montanes R, Calero F. Albuminuria: beyond the kidney. *Med Clin (Barc)* 2008; 130: 20-3.
- 22.Jafar TH, Stark PC, Schmid CH, Landa M, Maschio G, Marcantoni C, et al. Proteinuria as a modifiable risk factor for the progression of non-diabetic renal disease. *Kidney Int* 2001; 60: 1131-40.
- 23.Ruggenenti P, Perna A, Remuzzi G. Retarding progression of chronic renal disease: the neglected issue of residual proteinuria. *Kidney Int* 2003; 63: 2254-61.
- 24.Ruggenenti P, Perna A, Gherardi G, Garini G, Zoccali C, Salvadori M, et al. Renoprotective properties of ACE-inhibition in non-diabetic nephropathies with non-nephrotic proteinuria. *Lancet* 1999; 354: 359-64.
- 25.Lewis EJ, Hunsicker LG, Bain RP, Rohde RD. The effect of angiotensin-converting-enzyme inhibition on diabetic nephropathy. The Collaborative Study Group. *N Engl J Med* 1993; 329: 1456-62.
- 26.Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR, Berl T, Pohl MA, Lewis JB, et al. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2001; 345: 851-60.
- 27.Hou FF, Zhang X, Zhang GH, Xie D, Chen PY, Zhang WR, et al. Efficacy and safety of benazepril for advanced chronic renal insufficiency. *N Engl J Med* 2006; 354: 131-40.
- 28.Nakao N, Yoshimura A, Morita H, Takada M, Kayano T, Ideura T. Combination treatment of angiotensin-II receptor blocker and angiotensin-converting-enzyme inhibitor in non-diabetic renal disease (COOPERATE): a randomised controlled trial. *Lancet* 2003; 361: 117-24.
- 29.Kent DM, Jafar TH, Hayward RA, Tighiouart H, Landa M, De JP, et al. Progression risk, urinary protein excretion, and treatment effects of angiotensin-converting enzyme inhibitors in nondiabetic kidney disease. *J Am Soc Nephrol* 2007; 18: 1959-65.
- 30.Hou FF, Xie D, Zhang X, Chen PY, Zhang WR, Liang M, et al. Renoprotection of Optimal Antiproteinuric Doses (ROAD) Study: a randomized controlled study of benazepril and losartan in chronic renal insufficiency. *J Am Soc Nephrol* 2007; 18: 1889-98.
- 31.Gracia S, Montañés R, Bover J, Cases A, Deulofeu R, Martín de Francisco AL, et al. Recomendaciones sobre la utilización de ecuaciones para la estimación del filtrado glomerular en adultos. *Nefrología* 2006; 26: 658-65.
- 32.32. Levey AS, Eckardt KU, Tsukamoto Y, Levin A, Coresh J, Rossert J, et al. Definition and classification of chronic kidney disease: a position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). *Kidney Int* 2005; 67: 2089-100.
- 33.Eckardt KU, Berns JS, Rocco MV, Kasiske BL. Definition and classification of CKD: the debate should be about patient prognosis—a position statement from KDOQI and KDIGO. *Am J Kidney Dis* 2009; 53: 915-20.
- 34.National Institute for Health and Clinical Excellence. Chronic Kidney Disease: National Clinical Guideline for Early Identification and Management in Adults in Primary and Secondary Care. Clinical Guideline 73 [Internet], 2008; [consultado el 15-6-2010]. Disponible en: <http://www.nice.org.uk/Guidance/cg73>.
- 35.Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Diagnosis and Management of Chronic Kidney Disease: Guideline 103 [Internet], 2008; [consultado el 15-6-2010]. Disponible en: <http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/103/index.html>.
- 36.Taal M, Tomson C. Clinical Practice Guidelines for the Care of Patients with Chronic Kidney Disease. UK Renal Association Clinical Practice Guidelines [Internet], 2007; [consultado el 15-6-2010]. Disponible en: http://www.renal.org/pages/media/download_gallery/CKDfinalMar07.pdf.
- 37.Crowe E, Halpin D, Stevens P. Early identification and management of chronic kidney disease: summary of NICE guidance. *BMJ* 2008; 337: a1530.
- 38.Bauer C, Melamed ML, Hostetter TH. Staging of chronic kidney disease: time for a course correction. *J Am Soc Nephrol* 2008; 19: 844-6.
- 39.Glasscock RJ, Winearls C. The global burden of chronic kidney disease: how valid are the estimates? *Nephron Clin Pract* 2008; 110: c39-c46.
- 40.De Jong PE, Gansevoort RT. Fact or fiction of the epidemic of chronic kidney disease—let us not squabble about estimated GFR only, but also focus on albuminuria. *Nephrol Dial Transplant* 2008; 23: 1092-5.
- 41.Glasscock RJ, Winearls C. Screening for CKD with eGFR: doubts and dangers. *Clin J Am Soc Nephrol* 2008; 3: 1563-8.
- 42.Glasscock RJ, Winearls C. An epidemic of chronic kidney disease: fact or fiction? *Nephrol Dial Transplant* 2008; 23: 1117-21.
- 43.Hoyer JR, Seiler MW. Pathophysiology of Tamm-Horsfall protein. *Kidney Int* 1979; 16: 279-89.
- 44.Joint Specialty Committee on Renal Medicine of the Royal College of Physicians and the Renal Association, and the Royal College of General Practitioners. Chronic Kidney Disease in Adults: UK Guidelines for Identification, Management and Referral. London: Royal College of Physicians [Internet], 2006; [consultado el 15-6-2010]. Disponible en: <http://www.renal.org/CKDguide/full/CKDprintedfullguide.pdf>.
- 45.Caring for Australasians with Renal Impairment (CARI). Chronic Kidney Disease Guidelines: Urine Protein as Diagnostic Test [Internet], 2004; [consultado el 15-6-2010]. Disponible en: http://www.cari.org.au/ckd_urineprot_list_pub2004.php.
- 46.Mogensen CE, Christensen CK. Predicting diabetic nephropathy in insulin-dependent patients. *N Engl J Med* 1984; 311: 89-93.
- 47.Parving HH, Andersen AR, Smidt UM, Svendsen PA. Early aggressive antihypertensive treatment reduces rate of decline in kidney function in diabetic nephropathy. *Lancet* 1983; 1: 1175-9.
- 48.Halimi JM, Hadjadj S, Aboyans V, Allaert FA, Artigou JY, Beaufrils M, et al. Microalbuminuria and urinary albumin excretion: French guidelines. *Ann Biol Clin (Paris)* 2008; 66: 277-84.
- 49.Miller WG, Bruns DE, Hortin GL, Sandberg S, Aakre KM, McQueen MJ, et al. Current issues in measurement and reporting of urinary albumin excretion. *Clin Chem* 2009; 55: 24-38.
- 50.Atkins RC, Briganti EM, Zimmet PZ, Chadban SJ. Association between albuminuria and proteinuria in the general population: the AusDiab Study. *Nephrol Dial Transplant* 2003; 18: 2170-4.
- 51.Newman DJ, Thakkar H, Medcalf EA, Gray MR, Price CP. Use of urine albumin measurement as a replacement for total protein. *Clin Nephrol* 1995; 43: 104-9.
- 52.Kashif W, Siddiqi N, Dincer AP, Dincer HE, Hirsch S. Proteinuria: how to evaluate an important finding. *Cleve Clin J Med* 2003; 70: 53546.
53. Brandt JR, Jacobs A, Raissy HH, Kelly FM, Staples AO, Kaufman E, et al. Orthostatic proteinuria and the spectrum of diurnal variability of urinary protein excretion in healthy children. *Pediatr Nephrol* 2010; 25: 1131-7.
- 54.Hogg RJ, Portman RJ, Milliner D, Lemley KV, Eddy A, Ingelfinger J. Evaluation and management of proteinuria and nephrotic syndrome in children: recommendations from a pediatric nephrology panel established at the National Kidney Foundation conference on proteinuria, albuminuria, risk, assessment, detection, and elimination (PARADE). *Pediatrics* 2000; 105: 1242-9.
- 55.Heathcote KL, Wilson MP, Quest DW, Wilson TW. Prevalence and duration of exercise induced albuminuria in healthy people. *Clin Invest Med* 2009; 32: E261-E265.
- 56.Ginsberg JM, Chang BS, Matarese RA, Garella S. Use of single voided urine samples to estimate quantitative proteinuria. *N Engl J Med* 1983; 309: 1543-6.
- 57.Christopher-Stine L, Petri M, Astor BC, Fine D. Urine protein-to-creatinine ratio is a reliable measure of proteinuria in lupus nephritis. *J Rheumatol* 2004; 31: 1557-9.
- 58.Xin G, Wang M, Jiao LL, Xu GB, Wang HY. Protein-to-creatinine ratio in spot urine samples as a predictor of quantitation of proteinuria. *Clin Chim Acta* 2004; 350: 35-9.
- 59.Price CP, Newall RG, Boyd JC. Use of protein:creatinine ratio measurements on random urine samples for prediction of significant proteinuria: a systematic review. *Clin Chem* 2005; 51: 1577-6.
- 60.Gaspari F, Perico N, Remuzzi G. Timed urine collections are not needed to measure urine protein excretion in clinical practice. *Am J Kidney Dis* 2006; 47: 1-7.
- 61.Morales JV, Weber R, Wagner MB, Barros EJ. Is morning urinary protein/creatinine ratio a reliable estimator of 24-hour proteinuria in patients with glomerulonephritis and different levels of renal function? *J Nephrol* 2004; 17: 666-72.
- 62.Kristal B, Shasha SM, Labin L, Cohen A. Estimation of quantitative proteinuria by using the protein:creatinine ratio in random urine samples. *Am J Nephrol* 1988; 8: 198-203.
- 63.Rodby RA, Rohde RD, Sharon Z, Pohl MA, Bain RP, Lewis EJ. The urine protein to creatinine ratio as a predictor of 24-hour urine protein excretion in type 1 diabetic patients with nephropathy. The Collaborative Study Group. *Am J Kidney Dis* 1995; 26: 904-9.
- 64.Chitalia VC, Kothari J, Wells EJ, Livesey JH, Robson RA, Searle M, et al. Cost-benefit analysis and prediction of 24-hour proteinuria from the spot urine protein-creatinine ratio. *Clin Nephrol* 2001; 55: 436-47.
- 65.Lane C, Brown M, Dunsmuir W, Kelly J, Mangos G. Can spot urine protein/creatinine ratio replace 24 h urine protein in usual clinical nephrology? *Nephrology (Carlton)* 2006; 11: 245-9.
- 66.Chaiken RL, Khawaja R, Bard M, Eckert-Norton M, Banerji MA, Lebovitz HE. Utility of untimed urinary albumin measurements in assessing albuminuria in black NIDDM subjects. *Diabetes Care* 1997; 20: 709-13.
- 67.Marshall SM. Screening for microalbuminuria: which measurement? *Diabet Med* 1991; 8: 706-11.
- 68.Lamb E, Newman D, Price C. Kidney function test. En: Burtis C, Ashwood E, Bruns D (eds.). *Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics*. Saint Louis: Saunders Elsevier, 2006.
- 69.Brinkman JW, De ZD, Duker JJ, Gansevoort RT, Kema IP, Hillege HL, et al. Falsely low urinary albumin concentrations after prolonged frozen storage of urine samples. *Clin Chem* 2005; 51: 2181-3.
- 70.Brinkman JW, Heerspink HL, De ZD, Gansevoort RT, Bakker SJ. Urinary pH affects albumin concentrations after prolonged frozen storage. *Nephrol Dial Transplant* 2007; 22: 3670.
- 71.Brinkman JW, De ZD, Gansevoort RT, Duker JJ, Kema IP, De Jong PE, et al. Prolonged frozen storage of urine reduces the value of albuminuria for mortality

prediction. Clin Chem 2007; 53: 153-4.

72. Brinkman JW, De ZD, Lambers Heerspink HJ, Gansevoort RT, Kema IP, De Jong PE, et al. Apparent loss of urinary albumin during long term frozen storage: HPLC vs immunonephelometry. Clin Chem 2007; 53: 1520-6.

73. Rumley A. Urine dipstick testing: comparison of results obtained by visual reading and with the Bayer CLINITEK 50. Ann Clin Biochem 2000; 37(Pt 2): 220-1.

74. Scotti A, Falkenberg M. Analytical interferences of drugs in the chemical examination of urinary protein. Clin Biochem 2007; 40: 1074-6.

75. Ralston SH, Caine N, Richards I, O'Reilly D, Sturrock RD, Capell HA. Screening for proteinuria in a rheumatology clinic: comparison of dipstick testing, 24 hour urine quantitative protein, and protein/creatinine ratio in random urine samples. Ann Rheum Dis 1988; 47: 759-63.

76. Waugh JJ, Clark TJ, Divakaran TG, Khan KS, Kilby MD. Accuracy of urinalysis dipstick techniques in predicting significant proteinuria in pregnancy. Obstet Gynecol 2004; 103: 769-77.

77. James GP, Bee DE, Fuller JB. Proteinuria: accuracy and precision of laboratory diagnosis by dip-stick analysis. Clin Chem 1978; 24: 1934-9.

78. Welsh Assembly Government. Designed to Tackle Renal Disease in Wales: A National Service Framework [Internet], 2007; [consultado el 15-6-2010]. Disponible en: [http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/434/Designed to Tackle Renal Disease in Wales - Eng.pdf](http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/434/Designed%20to%20Tackle%20Renal%20Disease%20in%20Wales-Eng.pdf).

79. Guy M, Newall R, Borzomato J, Kalra PA, Price C. Use of a first-line urine protein-to-creatinine ratio strip test on random urines to rule out proteinuria in patients with chronic kidney disease. Nephrol Dial

Transplant 2009; 24: 1189-93.

80. Graziani MS, Gambaro G, Mantovani L, Sorio A, Yabarek T, Abaterusso C, et al. Diagnostic accuracy of a reagent strip for assessing urinary albumin excretion in the general population. Nephrol Dial Transplant 2009; 24: 1490-4.

81. Guy M, Newall R, Borzomato J, Kalra PA, Price C. Diagnostic accuracy of the urinary albumin: creatinine ratio determined by the CLINITEK Microalbumin and DCA 2000 for the rule-out of albuminuria in chronic kidney disease. Clin Chim Acta 2009; 399: 548.

82. Sedmak JJ, Grossberg SE. A rapid, sensitive, and versatile assay for protein using Coomassie brilliant blue G250. Anal Biochem 1977; 79: 544-52.

83. McElderry LA, Tarbit IF, Cassells-Smith AJ. Six methods for urinary protein compared. Clin Chem 1982; 28: 356-60.

84. Nishi HH, Elin RJ. Three turbidimetric methods for determining total protein compared. Clin Chem 1985; 31: 1377-80.

85. Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. XIX Programa de Garantía Externa de la Calidad de Bioquímica (orina) [Internet], 2009; [consultado el 22-11-2010]. Disponible en: <http://www.contcal.org/k3/docs/2009/ANUAL/orina.pdf>.

86. Aakre KM, Thue G, Subramaniam-Haavik S, Bukve T, Morris H, Muller M, et al. Postanalytical external quality assessment of urine albumin in primary health care: an international survey. Clin Chem 2008; 54: 1630-6.

87. Osicka TM, Comper WD. Characterization of immunochemically nonreactive urinary albumin. Clin Chem 2004; 50: 2286-91.

88. Itho Y, Hosogaya S, KKHS. Standardization of

immunoassays for urine albumin. Jpn J Clin Chem 2008; 5: 14.

89. Singh R, Crow FW, Babic N, Lutz WH, Lieske JC, Larson TS, et al. A liquid chromatography-mass spectrometry method for the quantification of urinary albumin using a novel 15N-isotopically labeled albumin internal standard. Clin Chem 2007; 53: 540-2.

90. Standards of medical care in diabetes-2010. Diabetes Care 2010; 33(Suppl 1): S11-S61.

91. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL, Jr, et al. Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003; 42: 1206-52.

92. Levin A, Hemmelgarn B, Culeton B, Tobe S, McFarlane P, Ruzicka M, et al. Guidelines for the management of chronic kidney disease. CMAJ 2008; 179: 1154-62.

93. Alcázar R, Egocheaga MI, Orte L, Lobos JM, González PE, Álvarez GF, et al. Documento de consenso S.E.N.-semFYC sobre la Enfermedad Renal Crónica. Nefrología 2008; 28: 273-82.

MiniCollect®
by VACUETTE®

greiner bio-one

VACUETTE®
one step ahead

Telefax: (54 11) 4942-1869 / 49
E-mail: niproarg@nipromed.com
Web: www.nipro.com

Bioseguridad, Calidad, Garantía y Respaldo